

ทำอย่างใดเมื่อเป็นโรคไข้เลือดออก



ປັດຈຸບັນຍັງໄດ້ມີຄຳຕ້ານເສື່ອໄວຣັດ

โรคไข้เลือดออกโดยตรงการรักษาโรคนี้จึงเป็นการรักษา

ตามอาการ และประสิทธิภาพของผู้ป่วยแต่ละคน ดังนั้น

ការផ្សព្វផ្សាយនេះ គួរតែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការសិក្សាបន្ថែមទៀត។

หากจำเป็นต้องให้ยาลดไข้ควรให้ยาพาราเซตามอล

ห้ามใช้แอลกอฮอล์เพราะจะมีผลทำให้เลือดออกง่าย

กล่าวปกติ

หากมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ไม่ หรือ น้ำตาล

เกตุอแรบออยๆ

ถ้าหากต้องการไม่ติดจนควรรู้พามาพบแพทย์ทันที



การป้องกัน

3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่

เกาะพิทักษ์ของยูง

2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ครึ่ง ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ผู้เผย

3. เก็บมาสำรวจถามแนะนำให้มีภาคให้ผลิต
ป้องกันยุ่งไปทางนี้ เพื่อป้องกัน


ต้องกันยุ่งไปว้างไป เพื่อป้องกัน

3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก

เรกคิตสเชื่อว่ารัฐธรรมาภิบาล และเราคงได้พบด้วยตนเอง



Lucy



ด้วยพระพรตคุณ

การบริการลูกค้าด้วยหัวใจ

เทศบาลตำบลบ้านป่า
อ.เมือง อ.พญามัง




ไข่เลือดออก

เกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี (Dengue) ซึ่งมีสายพันธุ์ 1,2,3,4 ส่วนน้อยเกิดจากเชื้อ ชิคุนกุนยาไวรัส


Chikungunya Virus)

พาหะ คือ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ยุงลาย จะได้รับเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก และเมื่อไปกัดคนอื่นก็จะแพร่เชื้อไปด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุต่ำกว่า 15 ปี โรคไข้เลือดออกจะระบาดทุกปี โดยเฉพาะฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกจำนวนมากและมีอัตราการตายร้อยละ 0.1 ยุงลายมี 2 ชนิดคือยุงลายบ้านและยุงลายสวนแต่ที่เป็นพาหะหลักคือ ยุงลายบ้าน จะออกหากินในเวลา กลางวัน มักหลบซ่อนตัวในมุมมืด แหล่งเพาะพันธุ์อยู่ตามภาชนะที่มีน้ำนิ่งและใส เช่น แจกัน โถงน้ำ ถ้วยรองขาตู้ เป็นต้น



อาการ

- ไข้สูงลอย 2 - 7 วัน
- ไข้สูง 39 - 41 C
- เบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้อง
- เจ็บใต้ชายโครงข้างขวา
- ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อวันที่ 2 - 3
- เด็กมักซึมลง
- หน้าแดง ตัวแดง อาจมีผื่นหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง



อาการวิกฤตของไข้เลือดออก

คือ การเกิดภาวะ ช็อค

ซึ่งมีอาการดังนี้



ไข้ลงอย่างรวดเร็ว ซึมลง ตัวเย็น มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย ชีพจรเบาเร็วแต่ยังมีสติอยู่รู้เรื่อง กระหายน้ำ ถ่ายปัสสาวะน้อย ปวดท้องมากขึ้น กะทันหัน มีเลือดกำเดาไหลหรืออาเจียนเป็นเลือด ถ่ายอุจจาระสีดำ ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะเสียชีวิตภายใน 12 - 24 ชั่วโมง

